

Caloncoba gilgiana

Nom scientifique : *Caloncoba gilgiana* Sprague Gilg.

Famille : Achariaceae

Répartition et état de conservation : petit arbre épineux de Haute Guinée, s'étendant jusqu'au Sud du Nigeria le long des cours d'eau et dans les zones côtières. Non évalué par la liste rouge de l'UICN.

Noms courants: Iroko ojo (Yoruba).

Fruits /graines : globuleux jaunes lisses, contenant de nombreuses graines dans une pulpe gélatineuse.

Période de fructification : Août.

Méthode d'extraction des graines : cueillez les fruits de l'arbre une fois mûrs et arrachez la peau coriace pour retirer les graines qui sont maintenues ensemble par la pulpe collante.

Type de graine : récalcitrante

Mode de semis : semez à plat à une profondeur de 2 cm.

Substrat de semis : sol forestier

Période de germination : 14 jours.

Pourcentage de germination : 70 %

Croissance et développement : les semis se développent rapidement ; ils nécessitent un ombrage partiel et peuvent être transplantés 6 semaines après la germination. Les jeunes arbres commencent à fleurir et à fructifier après 1 an.

Remarques : semble bien se développer en culture comme plante ornementale dans des conditions humides / mouillées, y compris la savane côtière.