

## ***Monodora tenuifolia***

**Nom scientifique :** *Monodora tenuifolia* Benth.

**Famille :** Annonacée

**Répartition et état de conservation :** largement répandu dans les forêts sempervirentes et semi-décidues, et en bordure des forêts jusqu'au nord du Niger et de Kaduna. Non évalué par la liste rouge de l'UICN.

**Noms courants:** African nutmeg (Anglais), Ehuru ofia (Igbo), Lakosin, Ehinawosin (Yoruba), Uyenghen (Edo).

**Fruits /graines :** gros, lisses, globuleux, verts avec des taches pâles, devenant jaune orangé à maturité, contenant de nombreuses graines brunes, de la taille d'un pois, aromatiques dans une pulpe fibreuse et collante.

**Période de fructification :** Mai - Août.

**Méthode d'extraction des graines :** cueillez les fruits mûrs de l'arbre ; ouvrez-les avec un couteau pour retirer les graines, lavez-les à l'eau pour enlever la pulpe.

**Type de graine :** orthodoxe.

**Mode de semis :** semez les graines dans des plateaux ou des pots à une profondeur de 2 cm

**Substrat de semis :** terre végétale.

**Période de germination :** 21 - 30 jours.

**Pourcentage de germination :** 57 %

**Croissance et développement :** les jeunes plantes ont besoin d'ombre et leur croissance est assez lente ; ils peuvent être plantés 12 semaines après la germination et tolèrent le plein soleil s'ils sont acclimatés à des niveaux de luminosité plus élevés.

**Remarques :** petit arbre caduc qui s'adapte bien à la culture comme plante ornementale.