

## ***Pterocarpus osun***

**Nom scientifique** : *Pterocarpus osun* Craib.

**Famille** : Légumineuse

**Répartition et état de conservation** : endémique au Sud du Nigeria, du Cameroun et de la Guinée équatoriale, avec une répartition dispersée dans les forêts sempervirentes et semi-décidues de plaine. En déclin dans la zone forestière du Nigeria en raison du défrichage et de la dégradation des forêts. Non évalué par la liste rouge de l'UICN.

**Noms courants**: Black camwood, Lagos camwood, Bloodwood (Anglais), Osun dudu, Gbingbin (Yoruba), Akwara (Igbo), Ukme (Edo).

**Fruits /graines** : brun-orange, presque globuleux et légèrement pointus à l'apex, contenant 4 à 5 graines dures, brillante brun- foncé, de forme ellipsoïde et ancrées dans une pulpe rougeâtre.

**Période de fructification** : Décembre - Février.

**Méthode d'extraction des graines** : les fruits sont dispersés par le vent mais tombent généralement sous et autour de l'arbre mère où ils sont bien visibles et faciles à ramasser. Retirez l'aile pour extraire la/les graines(s).

**Type de graine** : récalcitrante.

**Mode de semis** : semez les graines à plat dans les sacs ou des pots à une profondeur de 2 cm

**Substrat de semis** : terre végétale.

**Période de germination** : 7 à 15 jours.

**Pourcentage de germination** : 70 %

**Croissance et développement** : les semis nécessitent un ombrage complet et la croissance est assez lente ; ils peuvent être plantés 20 semaines après la germination.

**Remarques** : parfois appelé simplement bois de cam, par confusion avec le vrai bois de cam, *Baphia nitida* Lodd.