Gambeya albida

Nom scientifique : *Gambeya albida* (G.Don) Aubrév. & Pellegr.

Famille : Sapotacée

Répartition et état de conservation : rencontrer dans la forêt tropicale de bas-fond et la galerie de forêt. Quasi menacé.

Noms courants: White star apple (Anglais), Agbalumo (Yoruba), Udala (Igbo), Otien (Edo), Agwaliba (Haoussa).

Fruits /graines : brun-orange, presque globuleux et légèrement pointus à l'apex, contenant 4 à 5 graines dures, brillantes, brun foncé, de forme ellipsoïde et ancrées dans une pulpe rougeâtre.

Période de fructification : Février - Mars.

Méthode d'extraction des graines : ramassez les fruits tombés sous l'arbre mère, appuyez les fruits pour les ouvrir avec les doigts afin d'en extraire les graines.

Type de graine : récalcitrante

Mode de semis : semez les graines à 2 cm de profondeur dans des caisses de sciure séchée, puis repiquez-les dans des pots contenant la terre forestière environ 2 semaines après l'observation de la germination.

Substrat de semis : d'abord la sciure séchée, puis la terre forestière

Période de germination : 14 à 21 jours.

Pourcentage de germination : 70 à 80 %

Croissance et développement : les semis nécessitent une ombre partielle en pépinière et au champ. Ils peuvent être plantés 60 jours après la germination. Les jeunes arbres mettent environ 10 ans avant de fructifier pour la première fois.

Remarques : la peau du fruit exsude un latex blanc collant lorsqu'il est coupé ou cassé, qui est difficile à enlever des mains et des vêtements ; appliquer de l'huile de palme pour enlever le latex de la peau et du kérosène pour l'enlever du tissu.