

Anonidium mannii

Nom scientifique : *Anonidium mannii* (Oliv.) Engl. & Diels

Famille : Annonacées.

Distribution et état de conservation : Il affectionne les forêts tropicales humides sempervirentes de plaine, souvent en bordure de cours d'eau et dans des sols humides et fertiles. Classé comme espèce de préoccupation mineure en raison de sa large distribution, mais localement peu commun.

Noms courants: Junglesop (Anglais), Ewuro-igbo (Yoruba), Imido (Igbo), Ogedegbo (Edo).

Fruit/graines : L'un des plus gros fruits comestibles d'Afrique, pesant de 4 à 15 kg, parfois jusqu'à 20 kg, charnu, ovoïde à sphérique.

Période de fructification : mai à septembre.

Méthode d'extraction des graines : extraites manuellement des fruits mûrs.

Type de graines : graines récalcitrantes à germination hypogée.

Méthode de semis : Semez directement en pépinière ou en pots. Les graines doivent être semées à une profondeur de 2 à 3 cm.

Substrat de semis : Mélange de terre forestière et de sable de rivière.

Période de germination : 31 à 45 jours.

Taux de germination : 60 % pour les graines fraîches (60/100 x 100).

Plantation : Ombre partielle durant les premières phases.

Croissance et développement : Grand arbre à feuilles persistantes, atteignant 25 à 35 m de hauteur, à la cime massive.

Remarques : Cet arbre contribue à la biodiversité forestière et à la sécurité alimentaire. Sa conservation est importante en raison de la pression croissante exercée sur les populations sauvages.