

## Picalima nitida

Nom scientifique : Picalima nitida (Stapf) T. Durand & H. Durand

Famille : Apocynacées

Distribution et état de conservation : Présente principalement dans les forêts tropicales humides de plaine.

Noms courants : Akuamma (Anglais), Àbére (Yoruba), Osi-igwe (Igbo).

Fruits/graines : Gros fruits ligneux ellipsoïdes à ovoïdes, de 10 à 20 cm de long, contenant 10 à 20 grosses graines aplaties et anguleuses dans la pulpe ; ces graines sont très prisées en médecine traditionnelle.

Période de fructification : juin à octobre.

Méthode d'extraction des graines : ouvrez manuellement pour en extraire les graines.

Type de graines : orthodoxes.

Méthode de semis : semis direct.

Substrat de semis : terre forestière et sable de rivière.

Période de germination : 14 à 30 jours.

Taux de germination : 90% (90/100 x 100)

Plantation : le jeune arbre tolère l'ombre.

Croissance et développement : arbre de petite à moyenne taille, pouvant atteindre 30 m de hauteur, à taux de croissance modérée. Il préfère les sols humides et bien drainés ainsi qu'une ombre partielle pendant la phase de croissance initiale. Son feuillage persistant est constitué de feuilles opposées et brillantes et de fleurs blanches parfumées.

Remarques : largement utilisé en médecine traditionnelle.